

# B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg

Wirkstoff: Cyanocobalamin

Injektionslösung

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg beachten?
3. Wie ist B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg ist ein Vitamin B<sub>12</sub>-Präparat. Cyanocobalamin gehört zur Gruppe der Stoffe, die zusammenfassend als „Vitamin B<sub>12</sub>“ bezeichnet werden.

### Anwendungsgebiet:

Vitamin B<sub>12</sub>-Mangel, der ernährungsmäßig nicht behoben werden kann.

Vitamin B<sub>12</sub>-Mangel kann sich in folgenden Krankheitsbildern äußern:

- Hyperchromer makrozytärer Megaloblastenanämie, (Perniciosa, Biermer-Anämie, Addison-Anämie; dies sind Reifungsstörungen der roten Blutzellen)
- Funikulärer Spinalerkrankung [Rückenmarkschädigung]

Ein labordiagnostisch gesicherter Vitamin B<sub>12</sub>-Mangel kann auftreten bei:

- Jährelanger Mangel- und Fehlernährung (z. B. durch streng vegetarische Kost).
- Malabsorption (ungenügender Aufnahme von Vitamin B<sub>12</sub> im Darm) durch ungenügender Produktion von Intrinsic factor (ein Eiweiß, das in der Magenschleimhaut gebildet und zur Aufnahme von Vitamin B<sub>12</sub> benötigt wird),
- Erkrankungen im Endabschnitt des Ileums (Teil des Dünndarms), z. B. Sprue,
- Fischbandwurmbefall oder
- Blind-loop-Syndrom (Änderung des Darmverlaufs nach Magenoperation).
- Angeborenen Vitamin B<sub>12</sub>-Transportstörungen.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg BEACHTEN?

**B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Cyano-

cobalamin oder einen der sonstigen Bestandteile von B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg sind.

## Besondere Vorsicht bei der Anwendung von B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg ist erforderlich:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## Wichtige Informationen über sonstige Bestandteile von B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000µg:

B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg enthält Natrium, aber weniger als 1mmol (23mg) Natrium pro Ampulle, d.h. es ist nahezu natriumfrei.

## Bei Anwendung von B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Aufgrund der Instabilität von Vitamin B<sub>12</sub> kann durch Zumi- schung anderer Arzneistoffe ein Wirkverlust des Vitamins auftreten.

## Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die empfohlene tägliche Vitamin B<sub>12</sub>-Zufuhr in der Schwang- erschaft und Stillzeit beträgt 4 µg. Nach den bisherigen Erfahrungen haben höhere Anwendungsmengen keine nachteiligen Auswirkungen auf das ungeborene Kind. Vit- amin B<sub>12</sub> wird in die Muttermilch ausgeschieden.

## 3. WIE IST B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg ANZUWEN- DEN?

Wenden Sie B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Zu Beginn der Behandlung wird in den ersten beiden Wochen nach Diagnosestellung 1 ml (1 Ampulle) B<sub>12</sub>»ANKERMANN«<sup>®</sup> 1000 µg ein- bis zweimal wöchent- lich verabreicht, entsprechend 1000 -2000 µg Cyanocoba- lamin pro Woche.

Bei nachgewiesener Vitamin B<sub>12</sub>-Aufnahmestörung im Darm werden anschließend 100 µg Cyanocobalamin einmal im Monat verabreicht.

#### Art der Anwendung:

B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg wird in der Regel intramuskulär verabreicht (in einen Muskel gespritzt). Es kann aber auch langsam intravenös oder subkutan (in eine Vene oder unter die Haut gespritzt) gegeben werden.

#### Dauer der Anwendung:

B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg ist zur längeren Anwendung bestimmt. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt.

#### Wenn eine größere Menge B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg angewendet wurde:

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

#### Wenn die Anwendung von B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg vergessen wurde:

Es sollte nicht die doppelte Dosis angewendet werden, wenn die vorherige Anwendung vergessen wurde.

#### Wenn Sie die Anwendung von B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg abbrechen:

Bei einer Unterbrechung der Behandlung gefährden Sie den Behandlungserfolg! Sollten bei Ihnen unangenehme Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt über die weitere Behandlung.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

#### Mögliche Nebenwirkungen:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
<b>Selten:</b>	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Hauterscheinungen (Akne sowie ekzematöse und urtikarielle Arzneimittelreaktionen) und Überempfindlichkeitserscheinungen (anaphylaktische bzw. anaphylaktoide Reaktionen) wurden in sehr seltenen Fällen beobachtet.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,  
D-53175 Bonn,  
Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg AUFZUBEWAHREN?

Das Verfalldatum ist auf dieser Packung und auf den Ampullen aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Ampullen sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

#### Aufbewahrungsbedingungen:

Für die Lagerung sind keine besonderen Temperaturbedingungen zu beachten.

Ampullen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel bitte sorgfältig und für Kinder unzugänglich auf.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### Was B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg enthält:

1 Ampulle mit 1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff: Cyanocobalamin 1000 µg

Die sonstigen Bestandteile sind:  
Natriumchlorid, Essigsäure, Wasser für Injektionszwecke.

#### Wie B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg aussieht und Inhalt der Packung:

Rote und klare Injektionslösung.

#### Originalpackungen:

5 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung  
10 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung

#### Anstaltspackungen:

100 Ampullen (10 x 10 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung als Bündelpackung)  
500 Ampullen (50 x 10 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung als Bündelpackung)

#### Pharmazeutischer Unternehmer

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG  
Calwer Str. 7, 71034 Böblingen  
Telefon: 07031/ 620 4-0, Fax: 07031/ 620 4-31  
E-Mail: [info@woerwagpharma.com](mailto:info@woerwagpharma.com)

#### Hersteller

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH  
Industriestraße 3, 34212 Melsungen

#### Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014.

#### Zur Information unserer Patienten:

Ihr Arzt hat Ihnen B<sub>12</sub> >>ANKERMANN<<<sup>®</sup> 1000 µg verordnet, ein Vitamin B<sub>12</sub>-Präparat.

Vitamin B<sub>12</sub> ist für den Zellstoffwechsel, eine normale Blutbildung und die Funktion des Nervensystems unentbehrlich. Es reguliert die körpereigene Produktion der Nucleinsäuren und damit den Aufbau neuer Zellkerne.

Ein Vitamin B<sub>12</sub>-Mangel kann durch unzureichende Aufnahme über die Nahrung (z. B. bei vegetarischer Ernährung, Fast food), durch Störungen in der Nahrungsaufnahme und Darmerkrankungen entstehen.

Ein Mangel an Vitamin B<sub>12</sub> kann sich in uncharakteristischen Symptomen äußern wie: Müdigkeit, blasses Aussehen, Kribbeln in Händen und Füßen, Gangunsicherheit und verminderte körperliche Belastbarkeit.

**WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen**

e-mail: [info@woerwagpharma.com](mailto:info@woerwagpharma.com)

VNr. 19-0514-00 / 600199

